

Барьеры к обращению за медицинской помощью молодых людей из ключевых групп населения и характеристики поведения ключевых групп при использовании презервативов

Шевченко Александра Евгеньевна — координаторка исследования, Teenenergizer

Плетнева Евгения Сергеевна — координатор проекта, Ассоциация «Е.В.А.»

Цели исследования

- Выявление барьеров в доступе к медицинским услугам среди молодых наркопотребителей
- Изучения влияния на молодых людей популярных ПАВ
- Влияние современной наркополитики на решение обращения за медицинской помощью молодыми наркопотребителями
- Использование презервативов молодыми наркопотребителями

Анонимное анкетирование

- Охват анкеты - 248 человек
- 95,2% респондентов ответили, что хотя бы раз принимали наркотики за последний год.
- 34,3% респондентов живут в Петербурге, + 2,1% - жители ЛО.



Санкт-Петербург, 2019

15 - 45 лет



56,2%



42,7%



1,1%

Большая часть опрошенных жителей Петербурга — студенты и выпускники высших учебных заведений.



<50




Больше половины опрошенных — 59,8% трудоустроены, из них только 32,7% работодатель предоставляет медицинскую страховку, при этом половина из работающих может претендовать на оплачиваемый больничный


Средний возраст сексуального дебюта — от 14 до 20 лет, наибольшее число начало сексуальную жизнь в 16 лет — это 27%.

91,5% всех российских респондентов хоть раз использовали презервативы


91% опрошенных петербуржцев хоть раз использовали презервативы. 24,7% использовали их с хорошо знакомым постоянным партнёром, 20,2% в последний раз использовали их со случайным партнёром, 40,4% предпочитали предохраняться и с супругом/парнем/девушкой. Всего 3,4% указали, что имели коммерческих партнёров, и при этом 2,2% опрошенных использовали презерватив.



Вы не использовали презерватив, потому что...



Был(а) ли ты и/или твой(я/и) партнёр (партнёрка, партнёры) в состоянии опьянения - алкогольного и/или наркотического?




Был(а) ли ты и/или твой(я/и) партнёр (партнёрка, партнёры) в состоянии опьянения -

Большинство ответивших петербуржцев предпочитают покупать презервативы в аптеке (42,7%).

По России 1-е место и 51,7% - также аптеки, 2-е и 18,5% – обычные магазины 3-е место — это спец.магазины, сексшопы (10,5%), а 4-е — надежда на партнёра (8,4%). 6,3% по России знают про мобильные пункты, а 4,6% никогда не пользовались презервативами, но не стоит забывать, что сюда входят и те, кто не занимался проникающим сексом.


Когда вам с партнёром(кой/ами) нужны презервативы, ты обычно... (Санкт-Петербург, ЛО)



- получаешь их в программе снижения вреда (автобус, центр профилактики, равный)
- покупаешь их в аптеке
- покупаешь их в какой-либо обычной (не специализированной)
- покупаешь их в специализированном магазине, секс-шопе онлайн или офлайн
- надеешься на партнёра по сексу, что у него/неё будут презервативы

Средний возраст наркотического дебюта — 17-18 лет


В каком возрасте ты попробовал(а) ПАВ (психоактивные вещества, наркотики)? (впиши ответ цифрой)



Лидеры потребительских предпочтений молодежи Петербурга — каннабиоиды, амфетамин и мефедрон. Однако моно-потребление характерно в основном только для потребителей каннабиоидов, тогда как абсолютное большинство респондентов предпочитают смешанное, **сочетанное употребление**.

Основная часть респондентов находится в употреблении более двух (34,9%) и пяти лет (39,8%).

Потребительские предпочтения




- Амфетамин, Эйфоретики (mdma, экстази и т.д.), Канабиноиды (шишки, трава, гишиш), Алтечные
- Канабиноиды (шишки, трава, гишиш) ● Опиаты, Канабиноиды (шишки, трава, гишиш)
- Амфетамин, Канабиноиды (шишки, трава, гишиш), Алкоголь
- Мефедрон, Канабиноиды (шишки, трава, гишиш), Алкоголь, Табак 49 more

45,8% опрошенных не считают, что потребление сказалось на их здоровье, 42,2% заметили ухудшение состояния здоровья. При этом 12% все же заметили позитивную динамику в связи с употреблением.

- 2 петербуржцев заразились ВИЧ,
- 5 - заразились гепатитом.
- Наиболее общая жалоба - ухудшение контроля эмоций 11,6%, при этом лишь 0,5% свидетельствуют о появившихся проблемах в общении и ухудшении психического состояния в целом
- 10,1% приобрели стоматологические проблемы,
- 9,5 % - пожаловались на учащенное сердцебиение;
- слабость в теле наблюдают у себя 8,3% опрошенных;
- похудели 5,5%;
- 6% хуже спят;
- 5,5% страдают от перепадов давления;
- 4,5% отметили что стали хуже выглядеть, столько же опрошенных страдают от паранойи,
- и те же 4,5% испытывают проблемы с пищеварительной системой.

Обращался(ась) ли ты за медицинской помощью в связи с употреблением?



34,8% (47 человек) не обращались за медпомощью в связи с употреблением, так как не видят в этом необходимости

14,8% (20 человек) не обращались за медпомощью из страха, что попадут в полицию


14,1% опасаются раскрыть свой статус наркопотребителя

11,9% боятся принудительного лечения

10,4 % предпочитают самолечение


7,4% предполагают, что не потянут расходы на лечение

Причины не обращения за медпомощью в связи с употреблением




Сталкивался(лась) ли ты с передозировками?

Санкт-Петербург



Сталкивался(лась) ли ты с передозировками? (если тебе приходилось сталкиваться с передозировками)

Чем была вызвана передозировка в последний раз?



86% не обратились за помощью

больше половины отказа от медицинской помощи при передозировке связано с различными страхами и рисками.

Причины не обращения за помощью при передозировке


Мне не было так плохо, чтобы надо было обращаться за помощью,
0,8%

Я не вижу необходимости в обращении за помощью,
9,9%

Мои близкие несколько раз перекрывались при мне, до сих пор помню, как раз...
0,8%

Я знаю, как лечиться самому,
18,2%


Я боюсь, что кто-то узнает о моём употреблении,
14,0%



14% боятся раскрыть свой статус, медработникам не доверяют 11,6%, принудительного лечения хотят избежать 8,3%. При этом 16,5% опрошенных опасаются, что медики сдадут пострадавших от передозировки полиции.



9,9% не считают нужным обращаться за помощью в принципе.

Практики снижения вреда



68,7% опрошенных пытались самостоятельно прекратить употреблять (основные техники самостоятельного выхода в ремиссию - снижение дозировки, самоизоляция, замещение потребления другими практиками). Один человек обратился в религиозную организацию
3 человека обратились в частные клиники, 2 - в госучреждения
6% были пытались выйти из употребления не по своей воле

47% опрошенных имели опыт общения с правоохранительными органами в связи с употреблением. Большинство из них были задержаны при различных обстоятельствах и свидетельствуют о процессуальных нарушениях, вплоть до подброса наркотиков. Три человека имели длительный опыт заключения, пятеро получили условный срок, двое сбежали от полицейских, трое - откупились.



Был ли у тебя опыт совершения противоправных действий в состоянии наркотического опьянения ?

